

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Respete la fecha de vencimiento.
- Emplee únicamente para el uso indicado en este envase.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y la aplicación.

INSTRUCCIONES PRIMEROS AUXILIOS:

Ingestión: No inducir al vómito. No dar a beber nada a una persona que se encuentra en estado de inconsciencia. Obtener atención médica de inmediato.

Inhalación: Retire al paciente a un lugar fresco, seco y aireado. Acudir al médico.

Ojos: Lavar con agua limpia durante 10 a 15 minutos. Acudir al médico.
Piel: Retirar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón. Acudir al médico.

EMERGENCIA TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM
 01000916012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el teléfono (57) 1 2886012

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- No contamine el agua de arroyos, lagunas, presas, ríos, canales o depósitos de agua lavando equipos o vertiendo en ellos residuos de bioinsumos.
- En caso de derrame se puede recoger directamente y desechos con los residuos normales. Se puede lavar con jabón y desalojar por el drenaje.
- Respetar las franjas de seguridad mínimas de 10 metros para aplicaciones terrestres distantes de los cuerpos o cursos de agua.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:

- Guarde los recipientes en un lugar fresco, seco y bajo llave.
- No almacene con productos para consumo humano o animal.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

ADVERTENCIA:

NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO BIOINSUMOS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.

AGENTE PARA RECOLECCIÓN DE ENVASES:

Corporación CAMPO LIMPIO
 Avenida Carrera 9 a #113-52 Oficina 607
 Bogotá D. C., Colombia
 Teléfonos: (+57-1) 6298955



DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITÉLO EN UN LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN

Fecha de aprobación ICA: 12/12/2019

REGALIA® SC

**Bioinsumo de Uso Agrícola
 Extracto Vegetal**

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo:
 Extracto de *Reynoutria sachalinensis* 224 g/L
Ingredientes Aditivos c.s.p. 1 litro

Registro de Venta No. 9432
 Titular del Registro CS AGRIBUSINESS S.A.S.
 Contenido neto: 1 Litro

No. Lote:
 Fecha de formulación:
 Fecha de vencimiento:

Producido por:
Marrone Bio Innovations Inc.
 Davis, U.S.A.



Importado y Distribuido por:
PRECISAGRO SAS
 Autopista Norte #122-35,
 Piso 2, Bogotá, Colombia



INTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

REGALIA® es un bioinsumo formulado como Suspensión Concentrada (SC), que contiene extracto de *Reynoutria sachalinensis*, planta perteneciente a la familia polygonaceae, originaria de Asia. **REGALIA®** desencadena la respuesta inmune en la planta, induciendo resistencia sistémica. Por medio de señales no patogénicas, **REGALIA®** induce a la planta a producir y acumular fitoalexinas, proteínas PR, antibióticos, compuestos fenólicos y fortalecedores de la célula vegetal, evitando así la germinación del patógeno.

Cultivo	Bianco Biológico	Dosis
Rosa	Mildeo polvoso (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	2.0L/ha
*Ornamentales (Rosa)	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.5L/ha
Banano (<i>Musa acuminata</i> Colla (AA))	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i> var <i>difformis</i> Morelet)	1.5L/ha**
Aguaçate (<i>Pearsea americana</i> Mill)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporoides</i> Penz)	2.0L/ha
Pastos	Helminthosporiosis (<i>Helminthosporium</i> spp)	1.2-1.5L/ha

*Debido al alto número de especies ornamentales, que dificultan el desarrollo de ensayos de eficacia para el registro de este bioinsumo en cada una de ellas, el usuario asume la responsabilidad del uso del producto en las especies de flores y plantas ornamentales no indicadas en el cuadro de uso, para lo cual debe realizar una prueba de prefiltrar con el objeto de evaluar el riesgo de fitotoxicidad del plaguicida antes de realizar una aplicación generalizada.

**Inicie aplicaciones como un control preventivo, dirigiendo la aspersión al follaje de la planta y con intervalos de aplicación entre 6 a 7 días.

MODO DE APLICACIÓN

REGALIA® se puede aplicar con los equipos convencionales de aplicación terrestre. Se debe hacer aplicación foliar cubriendo muy bien el follaje de las plantas a tratar. Pre mezclar la cantidad que se necesita en un recipiente limpio y después añadirlo al tanque aspersor mientras se llena. El agitador se debe mantener en movimiento mientras se llena el tanque y durante la aspersión.

Por su naturaleza **REGALIA®** es un producto indicado para programas de manejo integrado en rotación con otros productos, ya que no se presente riesgo en cuanto a la generación de resistencia por parte de los hongos patógenos. En ornamentales se recomienda hacer aplicaciones de forma preventiva.

En pastos se recomienda aplicar la dosis baja si existe baja presión de la enfermedad, es decir, valores de severidad menores del 10%. Una vez la severidad supere este valor, se recomienda aplicar las dosis altas del producto.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD

El productor garantiza que las características biológicas, físicas y químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante el proceso de registro del mismo, se verificó que es apto para los fines aquí recomendados, de acuerdo con las indicaciones de empleo.



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IV
 LIGERAMENTE TÓXICO
 PRECAUCIÓN**

