

DUSTER 50 SC

HERBICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN

AMETRYN

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	TRIAZINA
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	GHS: 5
USOS	Herbicida
CATEGORÍA	5

MODO DE ACCIÓN

DUSTER® 50 SC es un herbicida sistémico que controla numerosas malezas de hoja ancha y gramíneas que invaden los cultivos para los cuales se recomienda. Es absorbido por las hojas y raíces con translocación acropetálica vía xilema.

CULTIVOS PARA HONDURAS:

USOS

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	OBSERVACIONES
Caña de azúcar Saccharum officinarum Banano y plátano Musa spp.	GRAMÍNEAS: Muela de caballo Brachiaria mutica Pangola Digitaria sanguinalis Bermuda Cynodon dactylon Zacate pinto Echinochloa colonum Zacate de agua Echinochloa crus-galli	1.4L/ha (0.98L/mz)	Disolver las dosis recomendadas en un volumen de agua de 300L/ha (210L/mz) Momento de aplicación: preemergencia o postemergencia temprana (2-3 hojas de maleza)
Maíz Zea mays	Zacate de gallina Eleusine indica Plumilla Leptochloa filiformis Zacate Panicum maximum Zacate amargo Paspalum distichum cola de zorro Setaria geniculata	1.0L/ha (0.7L/mz)	
Piña Ananas comosus	HOJA ANCHA: Bledo Amaranthus spinosus Cadillo Bidens pilosa Crotalaria Crotalaria juncea Lechosa Euphorbia hirta Chilillo Poa annua Verdolaga Portulaca oleracea Escobillo Sida acuta, Sida rhombifolia	5.0 – 6.5 L/ha (3.5 – 4.6 L/mz)	

PRESENTACIONES

3.5L, 1L, 20L, 200L

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **DISAGRO®**.