SALVATE 20 SP

INSECTICIDAS
PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN
ACETAMIPRID

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS	
FAMILIA QUÍMICA	NEONICOTINOIDE
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	GHS: 5
USOS	Insecticida
CATEGORÍA IRAC	4A

MODO DE ACCIÓN
SALVATE ® 20 SP es un insecticida sistémico y traslaminar, que actúa por contacto e ingestión. Bloquea de forma irreversible las señales que son inducidas por la acetilcolina en la membrana postsináptica, interrumpiendo la transmisión de los impulsos entre las células nerviosas, provocando parálisis del insecto.

USOS PARA GUATEMALA:

USOS		
CULTIVO	**PLAGA**	**DOSIS**
Cítricos ***Citrus spp***	Mosca blanca ***Bemisia tabaci***	500g/ha (350g/mz) Volumen de caldo: 200L/ha (140L/mz) Momento de aplicación: cuando se observen los primeros ejemplares.
Chile pimiento ***Capsicum annuum*** Berenjena ***Solanum melongena*** Tomate ***Solanum lycopersicum*** Papa ***Solanum tuberosum*** Tabaco ***Nicotiana tabacum***	Pulgones ***Aphis gossypii***	250 – 500g/ha (175 – 350g/mz) Volumen de caldo: 100L/ha (70L/mz) Momento de aplicación: cuando se observen los primeros ejemplares.
	Mosca blanca ***Bemisia tabaci***	

Melón ***Cucumis melo*** Pepino ***Cucumis sativus*** Sandía ***Citrullus lanatus*** Güicoy ***Cucurbita pepo*** Calabaza ***Cucurbita máxima*** Güisquil ***Sechlum edule***	Mosca blanca ***Bemisia tabaco*** ***Bemisia argentifolii***	150 – 350g/ha (105 – 245g/mz) Volumen de caldo: 250L/ha (176L/mz) Momento de aplicación: cuando se observen los primeros ejemplares.
Arveja china ***Pisum sativum*** Frijol ***Phaseolus vulgaris*** Garbanzo ***Cicer arietinum*** Haba ***Vicia faba*** Lenteja ***Lens cularinaris*** Soya ***Glycine max***	Afidos ***Myzus persicae***	500g/ha (350g/mz) Volumen de caldo: 200L/ha (140L/mz) Momento de aplicación: cuando se observen los primeros ejemplares.
Aguacate ***Persea americana Mill*** Laurel ***Nectandra angustifolia*** Canela ***Cinnamomum verum***	Trips ***Heliothrips haemorrhoidalis***	500g/ha (350g/mz) Volumen de caldo: 200L/ha (140L/mz) Momento de aplicación: cuando se observen los primeros ejemplares.
Piña ***Ananas comosus***	Barrenador de la piña ***Strymon basilides*** Cochinilla ***Dysmicoccus brevipes***	1 – 1.25 kg/ha (0.7 – 0.87kg/mz) Volumen de caldo: 2000L/ha (1398.6L/mz) Momento de aplicación: 50 días después de la forza.

PRESENTACIONES
13g, 150g, 500g, 1kg, 25kg

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **DISAGRO®**.