

TOTEM 72 SL

HERBICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN

2,4 – D 720 g/L

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	ALQUILCLOROFENOXI
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	GHS: 4
USOS	Herbicida
CATEGORÍA	2,4-D: 4

MODO DE ACCIÓN

TOTEM® 72 SL es un herbicida sistémico-selectivo para control de malezas de hoja ancha. Actúa por translocación vía floema a lugares en donde hay mayor consumo de alimentos. La absorción también se efectúa por las raíces, transportándose por la savia hacia las zonas de mayor actividad metabólica.

USOS

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	OBSERVACIONES
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Bledo <i>Amaranthus spp.</i> , Verdolaga <i>Portulaca oleracea</i> ,	1.0 – 1.5 L/ha (0.7 – 1.0 L/mz)	La aplicación debe efectuarse después del macollamiento pero antes que inicie la floración.
Maíz <i>Zea mays</i>	Siempre viva <i>Commelina diffusa</i> Escobillo <i>Sida spp.</i> Coyolillo <i>Cyperus rotundus</i> Tomatillo <i>Solanum americanum</i>	1.0 – 1.75 L/ha (0.7 – 1.2 L/mz)	No se debe efectuar aplicación post-emergentes en suelos arenosos cuando el maíz tiene una altura de 24 cm, ni tampoco cuando se cultive para la producción de semilla híbrida.
Caña de azúcar <i>Saccharum officinarum</i>	Flor amarilla <i>Bidens pilosa</i> Lechuguilla <i>Sonchus oleraceus</i> Mostaza <i>Brassica campestris</i>	2.0 – 4.0 L/ha (1.4 – 2.8 L/mz)	Aplicar inmediatamente después de plantarse o antes que retoñen los brotes.
Café <i>Coffea arabica</i>	Rabanillo <i>Raphanus raphanistrum</i>	1.5 – 3.0 L/ha (1.0 – 2.1 L/mz)	Después que la caña retoñe, desde una altura de 30 cm, hasta que se cierren las hieleras.
Sorgo <i>Sorghum vulgare</i>		1.25 – 2.0 L/ha (0.9 – 1.4 L/mz)	La aplicación no debe tocar el follaje ni el tronco del café.
Pastizales		0.5 – 1.0 L/ha (0.35 – 0.7 L/mz)	Aplicar cuando la planta tenga una altura de 15cm.
		1.25 – 2.0 L/ha (0.9 – 1.4 L/mz)	Las leguminosas forrajeras pueden ser dañadas por el herbicida especialmente si ese aplica cuando la temperatura es elevada. No permitir que los animales se alimenten del pasto tratado durante 3 semanas después del tratamiento.

PRESENTACIONES

500 ML, 1 L, 3.5 L, 18 L, 200 L,

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **DISAGRO®**.