

VOLPIX 30 OD

INSECTICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN

SPIROTETRAMAT, PYMETROZINE

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	ÁCIDO TETRÁMICO, PIRIDINA
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	GHS: 5
USOS	Insecticida
CATEGORÍA	Spirotetramat: 23 Pymetrozine: 9B

MODO DE ACCIÓN

VOLPIX® 30 OD es un insecticida que combina la acción sistémica del spirotetramat con el efecto selectivo y sistémico del pymetrozine. La mezcla de ambos principios activos determina una acción combinada, ingresando a las hojas del cultivo trasladándose por medio del floema y xilema. En el insecto inhibe la biosíntesis de los lípidos (LBI), ocasionando la interrupción de su fisiología y metabolismo ocasionando la pérdida de movilidad y capacidad de alimentarse.

USOS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Chinchas <i>Oebalus spp.</i> Áfidos, Pulgones <i>Aphis craccivora</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Macrosiphum solanifolii</i> , <i>Brevicoryne brassicae</i> , <i>Myzus perscae</i> Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporarium</i>	0.6 – 0.8 L/ha (0.42 – 0.56 L/mz)
Arveja <i>Pisum sativum</i> Frijol / Ejote francés <i>Phaseolus vulgaris</i> Zucchini <i>Cucurbita pepo</i> Melón <i>Cucumis melo</i> Sandía <i>Citrullus lanatus</i> Pepino <i>Cucumis sativus</i> Ayote <i>Cucurbita argyosperma</i> Repollo <i>Brassica oleracea var. capitata</i> Brócoli <i>Brassica oleracea var. italica</i> Coliflor <i>Brassica oleracea var. botrytis</i> Lechuga <i>Lactuca sativa</i> Okra <i>Hibiscus esculentus</i> Ornamentales	Áfidos, Pulgones <i>Aphis craccivora</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Macrosiphum solanifolii</i> , <i>Brevicoryne brassicae</i> , <i>Myzus perscae</i> Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporarium</i>	

Papa <i>Solanum tuberosum</i> Tomate <i>Solanum lycopersicum</i> Chile pimiento o dulce <i>Capsicum annuum</i> Berenjena <i>Solanum melongena</i> Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i>	Paratrioza <i>Paratrioza spp.</i> Áfidos, Pulgones <i>Aphis craccivora</i>, <i>Aphis gossypii</i>, <i>Macrosiphum solanifolii</i>, <i>Brevicoryne brassicae</i>, <i>Myzus perscae</i> Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i>, <i>Trialeurodes vaporarium</i>	
Banano / Plátano <i>Musa spp.</i>	Cochinilla harinosa <i>Pseudococcus elisae</i>	
Palma africana <i>Elaeis guineensis</i>	Cochinilla <i>Dactylopius coccus</i>	
Cítricos <i>Citrus sp.</i>	Diaforina <i>Diaphorina citri</i> Cochinilla <i>Planococcus citri</i>	

PRESENTACIONES

1 L, 250 ML

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **DISAGRO®**.