

# KOWEN 8.8 EC

## INSECTICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

### COMPOSICIÓN

ACETAMIPRID, DELTAMETHRIN

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| FAMILIA QUÍMICA            | NEONICOTINOIDE, PIRETROIDE          |
| CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA | GHS: 4                              |
| USOS                       | Insecticida                         |
| CATEGORÍA                  | Acetamiprid: 4A<br>Deltametrina: 3A |

### MODO DE ACCIÓN

**KOWEN® 8.8 EC** es un insecticida que combina los ingredientes activos Acetamiprid, que presenta un modo de acción translaminar, sistémico, con translocación acropetal vía xilema, de contacto y estomacal; y Deltametrina, que es no sistémico, de contacto, estomacal y residual. Acetamiprid inhibe los receptores de acetilcolina afectando el sistema nervioso central del insecto, mientras Deltametrina inhibe la transmisión del impulso nervioso, llevando el insecto a la muerte.

### USOS

| CULTIVO                                                                                                                                                                      | PLAGA                                        | DOSIS                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Papa <i>Solanum tuberosum</i><br>Tomate <i>Solanum lycopersicum</i><br>Berenjena <i>Solanum melongena</i><br>Chile <i>Capsicum annuum</i><br>Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i> | Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i>           | 0.6 – 0.8 L/ha<br>(0.42 – 0.56 L/mz) |
| Pepino <i>Cucumis sativus</i><br>Calabaza <i>Cucurbita maxima</i><br>Zucchini <i>Cucurbita pepo</i><br>Sandía <i>Citrullus lanatus</i><br>Melón <i>Cucumis melo</i>          | Mosca blanca <i>Bemisia argentifolii</i>     |                                      |
| Apio <i>Apium graveolens</i><br>Zanahoria <i>Daucus carota</i>                                                                                                               | Mosca minadora <i>Liriomyza huidobrensis</i> |                                      |
| Ejote francés <i>Phaseolus vulgaris</i><br>Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i><br>Arveja <i>Pisum sativum</i><br>Soya <i>Glycine max</i>                                        | Trips <i>Frankliniella occidentalis</i>      |                                      |
| Cebolla <i>Allium cepa</i><br>Ajo <i>Allium sativum</i>                                                                                                                      | Trips <i>Thrips tabaci</i>                   | 0.8 – 1.0 L/ha<br>(0.56 – 0.70 L/mz) |

### PRESENTACIONES

1 L

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **DISAGRO®**.