

SAMBA 50 SC

HERBICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN

TERBUTRYN

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	TRIAZINA
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	GHS: 5
USOS	Herbicida
CATEGORÍA	Terbutrina: 5

MODO DE ACCIÓN

SAMBA® 50 SC es un herbicida selectivo sistémico que controla numerosas malezas de hoja ancha y gramíneas que invaden los cultivos para los cuales se recomienda. Es absorbido por las hojas y las raíces con translocación acropetálica vía xilema. Cuando **SAMBA® 50** se es aplicado, inhibe la fotosíntesis en el fotosistema II, impidiendo la absorción del CO₂ y la reacción de Hill, en especial durante la fase de germinación y en estadio de plántula. Requiere del agua de lluvia o del riego dentro de los 10 días de la aplicación para ser movido hacia la zona de la raíz de la maleza y ser efectivo.

USOS

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	OBSERVACIONES
Caña de azúcar Saccharum officinarum	Caminadora Rottboelia cochinchinensis Pajilla Panicum fasciculatum Cola de zorro Setaria geniculata Hierba de conejo Digitaria sanguinalis Arrocillo Echinochloa colona Zacate de agua Echinochloa crus-galli Bledo Amaranthus spinosus Rábano silvestre Raphanus raphanistrum Margarita blanca Bidens pilosa Bejucos Ipomoea purpurea	2.3 – 4.7 L/ha (1.6 – 3.3 L/mz)	En postemergencia temprana de las malezas. Para caña de azúcar se debe mezclar de 1-2L/ha (0.7-1.4L/mz) de 2,4-D y otros herbicidas como triazinas y sulfonilureas, a la dosis recomendada.

PRESENTACIONES

20 L

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **DISAGRO®**.

