

FALKATA 75 WG

HERBICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN

ISOXAFLUTOLE

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	OXAZOL
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	GHS: 5
USOS	Herbicida
GRUPO HRAC	27

MODO DE ACCIÓN

FALKATA®75 WG es un herbicida pre-emergente que inhibe la síntesis de carotenoides, a partir del bloqueo de la enzima 4 hidroxifenil piruvato dioxigenasa (HDDP) dejando la clorofila expuesta a fotooxidación. La falta de clorofila conlleva a una despigmentación dando al tejido de la planta una condición “albina” y posterior necrosis por falta de fotosíntesis.

CULTIVOS PARA GUATEMALA:

USOS

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	OBSERVACIONES
Caña de azúcar Saccharum officinarum	Bejuco <i>Ipomoea spp.</i> Bermuda <i>Cynodon dactylon (L). Pers</i> Botoncillo <i>Richardia scabra L.</i> Caminadora <i>Rottboellia cochinchinensis (Lour.) Clayton</i> Coyolillo <i>Cyperus rotundus L</i> Flor escondida <i>Phyllanthus niruri L</i> Golondrina chica <i>Euphorbia hirta L</i> Golondrina grande <i>Euphorbia prostrata</i> Hierba de pollo <i>Commelina spp.</i> Pajilla <i>Panicum fasciculatum Swartz</i> Pascuita <i>Euphorbia heterophylla L</i> Pata de paloma <i>Eleusina indica (L). Gaerth</i> Pepino de ratón <i>Cucumis spp.</i> Plumilla <i>Leptochloa filiformis (Lam). Beauv</i> Vergolaga <i>Portulaca oleracea</i>	0.15 – 0.25 kg/ha (0.105 - 0.175kg/mz)	Se recomienda diluir en 200L/ha (140L/mz) y aplicar en pre-emergencia.

PRESENTACIONES

1KG

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **DISAGRO®**.